

# 新しい糖尿病・心不全・DKD治療薬の流れ

## 基本9種

## 新合剤

### (Fantastic Four) 心不全治療

- A) ARNI エンレスト
- B) SGLT<sub>2</sub>-I ジャディアンス  
フォシーカ
- C) MRA エキサメタゾン クレンドニア
- D) B-Blocker メンテート

※ベリキューホ : NO感受性↑  
※ネオコララン : 心拍数抑制



### Four Pillars (DKD治療)

- A) ARB RAS阻害剤
- B) SGLT<sub>2</sub>-I ジャディアンス  
フォシーカ
- C) ステロイド系増進剤 クレンドニア
- D) GLP-1作動薬 リベリサス マンジャロ

※ ARBは腎臓に負担あり 血圧低下で手動でも良い

基本分類	薬	合剤	解説
①チアゾリジン	アクトス (15 30) 1日1回	メタクトLD	アクトス(15)+メホルミン(500)
②DPP4阻害	ジャヌビア ネシーナトラゼンタ 1日1回	メタクトHD	アクトス(30)+メホルミン(500)
//	テネリア オングリザ 1日1回	エクメットLD・HD <sup>(2回/1日)</sup>	エクア(50)+メホルミン(250)・(500)
//	エクア スイニ- 1日2回	メトアナLD・HD <sup>(2回)</sup>	スイニ-(100)+メホルミン(250)・(500)
//	ザファテック(50-100)マリセフ(12.5・25) 1回/W リベルサス(まず3・4W・次に7・4W・14) マンジャロ 1回/W SC	イニシンク <sup>(1回/1日)</sup>	ネシーナ(25)+メフォルミン(500)
③GLP-1作動		ソニアスLD	アクトス(15)+アマリール(1)
④ヒクアナイド*	メグルコ (250) (500) 250を9Tまで	カナリア	テネリア(20)+カナグル(100)
⑤αGI	ヘイスン (0.2 0.3) 食直前3回	スージャヌ	ジャヌビア(50)+スーグラ(50)
⑥速効性SU	ベイスン (0.2 0.3) 食直前3回	トラディアンスAP・BP	トラゼンタ(5)+ジャディアンス(10)・(25)
⑦SU剤	グルファスト (5 10) 食直前3回	リオベルLD	アクトス(15)+ネシーナ (25)
⑧SGLT2阻害	アマリール (0.5 1 3)	リオベルHD	アクトス(30)+ネシーナ (25)
⑨イメグリミン	スーグラ・フォシーカ・ルセフィド・ベルサ・アブルクセイ・ジャディアンス カナグル(100)	グルベス (食直前3回)	ヘイスン(0.2)+グルファスト(10)
	ツイミーグ(500)4T/2×		

1日1回の内服でコントロール可能時代へ  
(グルベス以外)

